

Prospect: Informații pentru utilizator**Daleron C junior 120 mg/10 mg granule pentru soluție orală**
Paracetamol/acid ascorbic

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Daleron C junior și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Daleron C junior
3. Cum să luați Daleron C junior
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Daleron C junior
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Daleron C junior și pentru ce se utilizează

Daleron C junior granule conține paracetamol și acid ascorbic (vitamina C). Paracetamolul inhibă sinteza de prostaglandine din sistemul nervos central, astfel scade febra și ameliorează durerea. Deoarece paracetamolul nu irită mucoasa stomacului, este indicat pacienților care au probleme gastrice și ulcer gastric sau duodenal.

Vitamina C întărește sistemul de apărare al organismului, contribuie la recuperarea mai rapidă a organismului și ameliorează, de asemenea, gustul medicamentului.

Medicamentul, administrat sub forma unei băuturi calde, este indicat în special copiilor cu dificultăți de înghițire, datorate inflamației mucoasei gurii și faringelui.

Daleron C junior este indicat pentru:

- scăderea febrei ce acompaniază infecții diverse, bacteriene și virale;
- ameliorarea durerilor ușoare până la moderate, asociate cu răceală și gripă;
- ameliorarea durerii acute de origine neinflamatorie (cum sunt durerile de cap, de dinți)
- ameliorarea durerii după traumatisme și intervenții medicale.

Dacă după 3 zile copilul dumneavoastră nu se simte mai bine sau se simte mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Daleron C junior**Nu luați Daleron C junior**

- dacă copilul este alergic la paracetamol, acid ascorbic sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).
- dacă copilul are insuficiență severă a rinichilor sau a ficatului.
- dacă copilul are insuficiență hepatică determinată de o infecție virală (hepatită virală).
- dacă copilul are din naștere o insuficiență a enzimei glucozo-6-fosfat-dehidrogenază din globulele roșii ale sângelui.

Atenționări și precauții

Înainte să luați Daleron C junior, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Copiii cu insuficiență renală sau hepatică, în formă ușoară până la moderată, pot lua Daleron C junior numai sub supraveghere medicală.

Copiii cu vârsta sub 2 ani pot lua Daleron C junior numai la indicația medicului.

Nu depășiți dozele recomandate.

Daleron C junior nu trebuie administrat în asociere cu alte medicamente care conțin paracetamol.

Dacă simptomele nu se îmbunătățesc după 3 zile de tratament, trebuie să vă adresați medicului.

Medicamentul nu este recomandat pacienților diabetici, deoarece conține zahăr.

Daleron C junior împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Administrarea concomitentă cu alte medicamente poate determina creșterea sau scăderea efectului

Daleron C junior sau ale altor medicamente. Spuneți medicului dumneavoastră dacă copilul dumneavoastră ia medicamente pentru:

- prevenirea coagulării sângelui (warfarină),
- reglarea motilității intestinale (metoclopramidă),
- prevenirea greței sau vărsăturilor (domperidonă),
- reglarea nivelului din sânge al colesterolului sau altor grăsimi (colestiramină),
- tratamentul crizelor epileptice (barbiturice, antiepileptice),
- tratamentul tuberculozei (rifampicină),
- tratamentul infecțiilor bacteriene (cloramfenicol),
- ameliorarea durerii (acid acetilsalicilic și alte medicamente antiinflamatorii nesteroidiene).

Dozele crescute de acid ascorbic pot influența rezultatele examenelor de laborator (determinarea nivelului glucozei, acidului uric, creatininei și fosfaților anorganici).

Utilizarea concomitentă de paracetamol și etanol poate crește acțiunea toxică a paracetamolului asupra ficatului.

Daleron C junior împreună cu alimente și băuturi

Dacă paracetamolul este luat concomitent cu alimentele, absorbția sa este redusă. De aceea, dați copilului medicamentul înainte de masă.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Daleron C junior conține paracetamol în doze recomandate copiilor.

Utilizarea în siguranță a paracetamolului în timpul sarcinii sau alăptării nu a fost stabilită cu certitudine.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Daleron C junior nu are efecte asupra capacității de a conduce vehicule și a folosi utilaje.

Daleron C junior conține zahăr. Un plic conține 4,538 g.

Dacă medicul v-a spus că aveți intoleranță la anumite glucide, spuneți medicului dumneavoastră înainte de utilizarea acestui medicament.

3. Cum să luați Daleron C junior

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza unică recomandată de paracetamol este de 10 până la 15 mg pe kg greutate corporală. Un plic (5 g) conține paracetamol 120 mg.

Copiii cu vârsta sub 2 ani pot lua Daleron C junior numai la indicația medicului.

Goliți conținutul unui plic într-un pahar, turnați lichid cald (apă sau ceai) peste granule, amestecați bine și dați copilului să bea băutura caldă.

Schema de dozaj pentru Daleron C junior granule:

Vârsta copilului (ani)	O doză unică
2-3	1 plic cu granule în 0,5 de lichid
4-6	2 plicuri cu granule în 1 dl lichid
7-10	2 până la 3 plicuri cu granule în 1-1,5 dl lichid
10-12	3 până la 4 plicuri cu granule în 1,5 dl lichid

Doza poate fi administrată la intervale de cel puțin 4 ore, dacă este necesar.
Nu se recomandă mai mult de 4 doze pe zi.

Dacă luați mai mult Daleron C junior decât trebuie

Dacă ați administrat copilului dumneavoastră o doză mai mare de medicament decât trebuie, contactați imediat medicul sau farmacistul, chiar dacă copilul pare să se simtă bine; semnele intoxicației pot apărea numai după câteva zile. Cantitatea de medicament ingerată trebuie eliminată din organism cât se poate de repede.

Dozele prea mari de paracetamol pot determina greață, vărsături și insuficiență hepatică severă, în special la pacienții cu afecțiuni preexistente la ficat sau rinichi. Semnele acute de supradoză pot apărea în decurs de 24 ore.

Semnele de insuficiență hepatică pot apărea numai după două, până la patru zile după administrarea unei supradoze.

Dacă uitați să luați Daleron C junior

Nu luați o doză dublă, pentru a compensa doza uitată.

Utilizați Daleron C junior pentru febră și durere, numai la nevoie.

Dacă încetați să luați Daleron C junior

Puteți întrerupe în siguranță administrarea medicamentului, atunci când nu mai aveți nevoie de tratament.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă Daleron C junior este administrat în dozele recomandate, reacțiile adverse sunt rare și ușoare.

Frecvența reacțiilor adverse în funcție de organe sau sisteme de organe:

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):

- greață,
- reacții de hipersensibilitate, în special erupții trecătoare pe piele, mâncărimi, urticarie,
- oboseală.

Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane):

- diaree,
- vărsături,
- icter,
- inflamația pancreasului (pancreatită),
- creșterea valorii în sânge a enzimelor hepatice,
- modificări ale numărului celulelor din sânge (leucopenie și trombocitopenie)
- reacții alergice severe pe piele.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, așa cum este menționat în Anexa V*. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Daleron C junior

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Daleron C junior

- Substanțele active sunt paracetamolul și acidul ascorbic.

5 g granule pentru soluție orală (1 plic) conține paracetamol 120 mg și acid ascorbic 10 mg.

- Celelalte componente sunt: amidon de porumb, povidonă K 25, acid citric anhidru, sucroză (zahăr), aromă de portocală, extract de paprika – E 160c (colorant portocaliu P-WS) și roșu de sfeclă – E 162 (colorant roz P-WS).

Cum arată Daleron C junior și conținutul ambalajului

Granule fine, de culoare portocaliu deschis.

Daleron C junior este disponibil în cutii cu 10 plicuri a câte 5 g granule pentru soluție orală.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto
Slovenia

Acest prospect a fost revizuit în Iulie, 2017.